



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

20 СЕН 2022

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению ВЕРРЕС-ЭДС
(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16)

Номер регистрационного удостоверения: 77-1-11.15-2870№ПВР-1-5.0/02583

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – ВЕРРЕС-ЭДС

Международное непатентованное наименование – Вакцина против эпизоотической диареи свиней живая культуральная сухая.

2. Лекарственная форма – лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций. Вакцина изготовлена из аттенуированного штамма (ИС) вируса эпизоотической диареи свиней (ЭДС) со средой высушивания.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой сухую пористую массу белого или розового цвета, быстро растворяющуюся при добавлении физиологического раствора. Срок годности вакцины – 12 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещено использовать вакцину по истечении срока годности. Вакцину необходимо использовать в течение 2-х часов после вскрытия флакона и растворения.

4. Вакцина расфасована по 1 см³ в стеклянные флаконы вместимостью 3 мл. В одном флаконе вакцины содержится 3 или 5 доз. Флаконы укупорены резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Флаконы с вакциной упакованы по 10 шт. в пластиковые коробки или блистеры с разделительными перегородками, обеспечивающими их неподвижность и целостность. В каждую коробку вложена инструкция по применению вакцины.

5. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °С.

6. Вакцину необходимо хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной, подвергшиеся замораживанию, без этикеток, с истекшим сроком годности, нарушением целостности или герметичности укупорки, измененным цветом или консистенцией содержимого, наличием посторонней примеси, а также остатки вакцины, не использованные в течение 2 часов после растворения, выбраковывают и обезвреживают путем кипячения в течение 30 минут. Утилизация обезвреженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. ВЕРРЕС-ЭДС – вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины.

10. У вакцинированных свиней вакцина вызывает формирование иммунитета к вирусу ЭДС через 14 суток после вакцинации, продолжительностью не менее 6 месяцев.

Вакцина ВЕРРЕС-ЭДС безопасна для свиней всех возрастов, лечебными свойствами не обладает. Титр вируса в вакцине не ниже 4,5 lg ТЦД₅₀ /см³.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцину применяют для профилактики эпизоотической диареи свиней.

12. Запрещается вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. В случае разлива вакцины зараженный участок пола заливают 5% раствором хлорамина или едкого натрия. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение.

14. Не подлежат вакцинации свиноматки после 95 дня супоросности, лактирующие животные и подсосные поросята.

15. Содержимое флакона с сухой вакциной ВЕРРЕС-ЭДС растворяют в стерильном физиологическом растворе из расчета 2 мл на одну прививную дозу вакцины.

Вакцину вводят внутримышечно в область верхней трети шеи или внутренней поверхности бедра в дозе 2 мл, используя для каждого животного отдельную стерильную иглу.

Вакциной ВЕРРЕС-ЭДС вакцинируют одновременно всех клинически здоровых супоросных свиноматок двукратно с интервалом 2 недели. В дальнейшем свиноматок вакцинируют двукратно на 75-80 и 90-95 день супоросности. Вакцинацию свиноматок против ЭДС в ранее неблагополучном хозяйстве прекращают через 6-8 месяцев после полного исчезновения заболевания.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается. После иммунизации у отдельных животных может наблюдаться незначительное повышение температуры тела и угнетение, которые проходят через 24-48 часов без медикаментозного вмешательства. В месте введения вакцины может быть образование незначительной припухлости, исчезающей самопроизвольно в течение 2-3 суток.

17. Симптомов проявления ЭДС или других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

18. Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

19. Особенности поствакцинальной реакции не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики эпизоотической диареи свиней. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Продукты убоя от вакцинированных свиней используют без ограничения независимо от сроков вакцинации.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против эпизоотической диареи свиней живой культуральной сухой ВЕРРЕС-ЭДС: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Генеральный директор ООО «Ветбиохим»



А.В. Кривонос