



20 СЕН 2022

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению ВЕРПЕС-СТРЕПТО

(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16)

Номер регистрационного удостоверения: 77-1-13.20-4686 № ПВР-1-13.20/03569

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – ВЕРПЕС-СТРЕПТО

Международное непатентованное наименование – Вакцина против стрептококкозов свиней инактивированная.

2. Лекарственная форма – суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из инактивированных формалином протективных антигенов *Streptococcus suis*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus porcinus* и *Streptococcus dysgalactiae*, в количестве 3,5 млрд.м.к/дозу каждого штамма, адсорбированных на Карбополе-971 – 10% от объема.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию, цвет которой может варьировать от светло-серого до желто-серого, с серо-белым осадком, легко разбивающимся при взбалтывании в гомогенную взвесь. Срок годности вакцины – 18 месяцев от даты выпуска. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна. Вакцину необходимо использовать в течение 8 часов после вскрытия флакона.

4. Вакцина расфасована по 100 мл (50 доз) в стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Одна коммерческая доза составляет 2 мл. Флаконы упакованы в картонные или пенопластовые ящики с разделительными перегородками, обеспечивающими сохранность вакцины. В каждый ящик с вакциной вложено несколько экземпляров инструкции по её применению.

5. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с вакциной без этикеток, с нарушенной укупоркой и целостностью, измененным цветом, содержащие посторонние примеси, подвергшиеся замораживанию, а также вакцину, неиспользованную в течение 8 часов после вскрытия флакона, выбраковывают и обезвреживают путем кипячения в течение 30 мин с последующей утилизацией. Утилизация обезвреженного препарата не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Вакцина отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. ВЕРПЕС-СТРЕПТО – вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины.

10. Вакцина вызывает формирование иммунитета к возбудителям стрептококкозов, вызываемых наиболее распространёнными видами *S. suis*, *S. pyogenes*, *S. porcinus* и *S. dysgalactiae* через 12-14 дней после повторного введения, продолжительностью не менее 6 месяцев. Колостральный иммунитет у поросят, полученных от иммунизированных животных, сохраняется до 21 дня.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики стрептококкозов у свиней всех возрастных групп в хозяйствах, неблагополучных по указанным заболеваниям.

12. Запрещено вакцинировать клинически больных и/или ослабленных животных.

13. При работе с вакциной следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение.

14. Не допускается проведение вакцинации свиноматок позже, чем за 25-30 суток до опороса, а также лактирующих животных.

15. Вакцину вводят супоросным свиноматкам внутримышечно в область верхней трети шеи (за ухом) в дозе 2 мл двукратно: первый раз – за 50-55 суток до опороса, второй раз – за 25-30 суток до опороса. Ревакцинацию проводят за 25-30 суток до каждого последующего опороса однократно в той же дозе.

Поросят вакцинируют, начиная с 14-дневного возраста. Вакцину вводят внутримышечно в бедренную группу мышц двукратно с интервалом 21-24 дня в дозе 2 мл, ревакцинацию проводят в возрасте 4 месяца однократно в той же дозе.

Перед применением вакцину подогревают до температуры 36-38 °С. Перед использованием и в процессе применения флаконы с вакциной периодически взбалтывают.

Вакцинацию проводят с соблюдением общепринятых правил асептики, для инъекции используют только стерильные материалы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу. Место инъекции дезинфицируют 70%-ным спиртом.

16. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

После введения вакцины у отдельных животных возможно кратковременное повышение температуры тела и/или местная воспалительная реакция, исчезающая через 1-3 суток.

17. Симптомов стрептококкозов, а также других патологических признаков при передозировке вакцины не выявлено.

18. Вакцину не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

19. Особеностей постvakцинальной реакции при первичной и повторной вакцинации не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики стрептококкозов свиней. В случае пропуска повторного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее. В таких случаях используют двукратную схему вакцинации в указанной дозе.

21. Продукты убоя от вакцинированных животных используют без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя вакцины против стрептококкозов свиней инактивированной ВЕРПЕС-СТРЕПТО: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Генеральный директор ООО «Ветбиохим»

А.В. Кривонос

